

NOMBRE COMERCIAL:

**INGREDIENTE ACTIVO:** POLIÉTER POLIMETILSILOXANO**REGIÓN:** MX **CLAVE:** FIT 13**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** COADYUVANTE ÓRGANO-SILICONADO PARA USO AGRÍCOLA**COFEPRIS:** 193300CO220087**PRESENTACIÓN:** 0.25, 1 L

FITOXTEND®: Es un coadyuvante surfactante órgano-siliconado modificado, para ser usado con los plaguicidas y fertilizantes foliares. **FITOXTEND®** es un coadyuvante no iónico el cual actúa como surfactante, humectante, dispersante y penetrante en plantas o insectos. **FITOXTEND®** mejora la aplicación, reduce la tensión superficial del agua (mojado uniforme), permite que los plaguicidas aplicados penetren en las hojas o insectos e incrementa la adhesión y absorción, la solubilidad y movilidad de los ingredientes activos y sea más eficiente el propósito de la aplicación.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

DETERMINACIÓN	RESULTADO %
Poliéter Polimetilsiloxano copolímero (Equivalente a 1,019.21 g de i.a./L)	100.00%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

¿CÓMO ES?	
Color	Amarillo claro
Apariencia	Viscoso
Solubilidad	100%
pH	6-8
Densidad	1.0 g/cm ³

DOSIS DE APLICACIÓN

Método para preparar y aplicar **FITOXTEND®** como coadyuvante en aspersion:

- **FITOXTEND®** como coadyuvante con insecticidas, herbicidas y fertilizantes foliares: Agregar la cantidad de 40 – 90 cc por cada 100L de agua en mezcla de aspersion.
- **FITOXTEND®** como coadyuvante en aplicaciones aéreas: Agregar la cantidad de 80 – 120 cc por cada 100L de agua en mezcla de aspersion.

PARÁMETROS TÉCNICOS

La dosis a emplear del producto varía dependiendo el cultivo y volumen de agua a utilizar.

Debe de agitarse antes de usarse y puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos de reacción neutra o ácida ya que no presenta problemas de compatibilidad.

Calibrar el equipo de aplicación, en un recipiente aparte colocar una pequeña cantidad de agua, agregar el producto y agitar, posteriormente vaciar la pre mezcla al tanque del equipo de aplicación y agregar la totalidad del agua. Este producto puede aplicarse con equipo manual, terrestre y avión.

CONTRAINDICACIONES: **NO** aplique cuando la velocidad del viento sea alta y/o cuando haya alta temperatura.

FITO TOXICIDAD: El **FITOXEND**® no es fitotóxico a las dosis recomendadas. Aplicar conforme a los métodos para preparar y agregar el **FITOXEND**®. Precaución cualquier SOBREDOSIS igual o mayor a 0.3% v/v puede ocasionar daños al cultivo.

ADVERTENCIAS DE USO

- Utilice el equipo de seguridad adecuado (overol, lentes, mascarillas). Evítese el contacto directo con la piel y los ojos.
- **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, aplicar tratamiento sintomático.
- **MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:** Disponga de los envases vacíos de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.
- No contamine cuerpos de agua, especialmente donde haya peces y que se utilicen para consumo humano o como abrevaderos para ganado.
- **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No se almacene ni transporte junto a alimentos, ropa y forrajes. Almacénese en un lugar fresco y seco. No se deje a la intemperie.