

NOMBRE COMERCIAL: **LUVÓN**
FORTE

INGREDIENTE ACTIVO: COMPLEJO HORMONAL.

REGIÓN: MX **CLAVE:** FIT 26

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: BIORREGULADOR DE CRECIMIENTO DE APLICACIÓN FOLIAR.

NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO: RSCO – 472/XII/21.

LICENCIA SANITARIA: 17NV 11 01122.

PRESENTACIÓN: 0.25, 1L.

LUVON FORTE® es un Biorregulador Orgánico de aplicación al follaje, formulado con citocininas de alta eficiencia las cuales contribuyen para acelerar la división celular (crecimiento de nuevos brotes y frutos) para obtener mayores y mejores cosechas. Se recomienda aplicar **LUVON FORTE®** en las etapas de mayor diferenciación y crecimiento celular con el objeto de obtener el máximo potencial genético de nuestro cultivo.

LUVON FORTE® favorece la floración. Se recomienda complementar con **FITOFRUT®** con el fin de obtener un mayor crecimiento, tamaño y calidad de fruto.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

DETERMINACIÓN	ppm
Citocininas	1,926.8

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

¿CÓMO ES?	
Color	Café
Apariencia	Líquido
Solubilidad	100%
pH	7.0
Densidad	1.2

DOSIS DE APLICACIÓN

CULTIVO	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS L/Ha
Zarzamora, frambuesa, fresa y arándano	Durante la brotación. Al inicio de la floración y amarre de fruto.	0.25-0.5
Naranja, limón y toronja	Al inicio del desarrollo vegetativo, para uniformizar floración y amarre de fruto.	0.5-1.0
Melón, calabacita y sandía	Aplicar en desarrollo vegetativo al iniciar las guías. Al inicio de la floración y posteriormente al amarre de frutos para mejorar calibres.	0.25-0.5
Manzana, pera y durazno	Al inicio de brotación y posteriormente en la etapa de floración para incrementar cuaje y tamaño de fruta.	0.5-1.0
Papaya, piña, plátano, mango y kiwi	Al inicio del desarrollo vegetativo, en caso de piña para mejorar la forma y el tamaño del fruto.	0.5-1.0
Tomate y chile	Para inducir brotación al inicio del desarrollo vegetativo. Repetir aplicación al inicio de floración para mejorar calibre, peso y calidad de fruta.	0.5-1.0
Papa	Para inducir brotación al inicio de la siembra.	0.25-0.5
Brócoli y coliflor	Al inicio del desarrollo vegetativo.	0.5-1.0
Ornamentales: rosas, crisantemos y claveles	Para inducir brotación de yemas laterales.	0.5-1.0
Cebolla y ajo	Aplicar cuando tenga 4 hojas verdaderas y repetir aplicaciones para mejorar el tamaño, forma y uniformidad del bulbo.	0.5-1.0



RECOMENDACIONES DE USO

Realizar las aplicaciones en horarios no calurosos. Si se realiza con avión, se disuelven los litros requeridos en la cantidad de agua que se utilice por hectárea. Aplicar por la tarde/noche o al amanecer sin que exista rocío sobre el follaje, antes de las horas críticas de mayor temperatura. Se recomienda el uso de coadyuvantes para mejorar la penetración, se puede mezclar con **TONDERO®**. **NO** se debe aplicar cuando el cultivo se encuentre en un estado de estrés por sequías, granizadas, heladas, deficiencias nutricionales, enfermedades u otra causa.

ADVERTENCIAS DE USO

- Utilice el equipo de seguridad adecuado (overol, lentes, mascarillas). Evítese el contacto directo con la piel y los ojos.
- **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, aplicar tratamiento sintomático.
- **MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:** Disponga de los envases vacíos de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.
- No contamine cuerpos de agua, especialmente donde haya peces, o que se utilicen para consumo humano o como abrevaderos para ganado.
- **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No se almacene ni transporte junto a alimentos, ropa, forrajes. Almacénese en un lugar fresco y seco. No se deje a la intemperie.

